

Test č. 1

Deskriptivní geometrie, I. ročník kombinovaného studia FAST,
letní semestr 2006-2007

Kuželosečky, afinita a kolineace

- (1) (a) Je dána elipsa $\mathcal{E}(F_1, F_2, a)$, $|F_1F_2| < 2a$. Sestrojte několik bodů elipsy, hyperoskulační kružnice, tečnu v libovolném bodě $T \in \mathcal{E}$, zkonstruujte kružnice z vět V_P, V_Q .
(b) Je dána elipsa $\mathcal{E}(A, B, e)$ a bod R . Sestrojte tečny z bodu R k elipse \mathcal{E} , určete body dotyku.
(c) Je dána elipsa $\mathcal{E}(A, B, e)$ a směr s . Sestrojte tečny rovnoběžné s daným směrem s k elipse \mathcal{E} , určete body dotyku.
- (2) (a) Je dána hyperbola $\mathcal{H}(F_1, F_2, a)$, $|F_1F_2| > 2a$. Sestrojte několik bodů hyperboly, hyperoskulační kružnice, tečnu v libovolném bodě $T \in \mathcal{E}$, zkonstruujte kružnice z vět V_P, V_Q .
(b) Je dána hyperbola $\mathcal{H}(F_1, F_2, A)$ a bod R . Sestrojte tečny z bodu R k hyperbole \mathcal{H} , určete body dotyku.
(c) Je dána hyperbola $\mathcal{H}(A, B, e)$ a směr s . Sestrojte tečny rovnoběžné s daným směrem s k hyperbole \mathcal{H} , určete body dotyku.

Poznámka: Úloha nemá řešení pro směr s , pokud $s' \parallel s$, kde $s' \in s$, neleží v úhlu asymptot obsahující vedlejší osu hyperboly \mathcal{H} .

- (3) (a) Je dána parabola $\mathcal{P}(F, d)$. Sestrojte několik bodů paraboly, hyperoskulační kružnici, tečnu v libovolném bodě $T \in \mathcal{E}$, zkonstruujte přímky z vět V_P, V_Q .
(b) Je dána parabola $\mathcal{P}(F, d)$ a bod R . Sestrojte tečny z bodu R k parabole \mathcal{P} , určete body dotyku.
(c) Je dána parabola $\mathcal{P}(F, d)$ a směr s . Sestrojte tečny rovnoběžné s daným směrem s k parabole \mathcal{P} , určete body dotyku.

- (4) K pravidelnému pětiúhelníku $ABCDE$ najděte affinu $A'B'C'D'E'$.
Affinita je stanovena osou o a dvojicí bodů A, A' .
- (5) Ve středové kolineaci (určené středem S , osou o , dvojicí bodů A, A') najděte k pravidelnému šestiúhelníku $ABCDEF$ kolineární.
- (6) Ve středové kolineaci $(S, o, u \rightarrow \infty u')$ sestrojte odpovídající přímky k přímkám a, b, c . (Poloha přímky a vůči ose o je různoběžná, b je s osou rovnoběžná, c je k ose kolmá), kde u je úběžnice, k níž koresponduje nevlastní přímka $\infty u'$ roviny.
- (7) Elipsa je určena sdruženými průměry KL, MN . Pomocí affinity sestrojte k nenarýsované elipse tečny z vnějšího bodu R .
- (8) Elipsa je určena sdruženými průměry KL, MN . Pomocí affinity sestrojte k nenarýsované elipse tečny tak, aby byly rovnoběžné s daným směrem s .
- Elipse e určené sdruženými průměry KL, MN přiřadíme affinu kružnici e' (např. nad průměrem KL , tedy $K \equiv K', L \equiv L'; M \rightarrow M'$). Osa affinity $o \equiv KL$ a dvojice odpovídajících bodů M, M' určují affinitu.*
- (9) Elipsa je dána sdruženými průměry. Vyrýsujte elipsu (*Rytzova konstrukce os elipsy*).

I. Elipsa: Elipsa \mathcal{E} je množina všech bodů v \mathbb{E}_2 , které mají od dvou pevných (různých) bodů v \mathbb{E}_2 , zvaných ohniska (značíme F_1, F_2) stálý součet vzdáleností rovný $2a$, který je větší než vzdálenost obou ohnisek.

Věta_T: V každém bodě \mathcal{E} existuje právě jedna tečna. Tečna půlí *vnější úhel průvodící* (tečnu značíme obvykle t , dotykový bod T). Normála n je kolmá na tečnu t v bodě T a půlí *vnitřní úhel průvodící*.

Věta_P: Množina pat P kolmic spuštěných z ohnisek elipsy \mathcal{E} na její tečny je *vrcholová kružnice* $k(S, a)$.

Věta_Q: Množina bodů Q souměrně sdružených s jedním ohniskem elipsy \mathcal{E} (například F_1) podle jejich tečen je *řídící kružnice* se středem v druhém ohnisku (F_2) a poloměrem $r = 2a$. Přitom platí $T \in QF_2$.

II. Hyperbola: Hyperbola \mathcal{H} je množina všech bodů v \mathbb{E}_2 , které mají od dvou pevných (různých) bodů v \mathbb{E}_2 , zvaných ohniska (značíme F_1, F_2) stálý rozdíl vzdáleností rovný $2a$, který je menší než vzdálenost obou ohnisek.

Věta_T: V každém bodě \mathcal{H} existuje právě jedna tečna. Tečna půlí *vnější úhel průvodící* (tečnu značíme obvykle t , dotykový bod T). Normála n je kolmá na tečnu t v bodě T a půlí *vnitřní úhel průvodící*.

Věta_P: Množina pat P kolmic spuštěných z ohnisek hyperboly \mathcal{H} na její tečny je *vrcholová kružnice* $k(S, a)$.

Věta_Q: Množina bodů Q souměrně sdružených s jedním ohniskem hyperboly \mathcal{H} (například F_1) podle jejich tečen je *řídící kružnice* se středem v druhém ohnisku (F_2) a poloměrem $r = 2a$. Přitom platí $T \in QF_2$.

III. Parabola: Parabola \mathcal{P} je množina všech bodů v \mathbb{E}_2 , které mají od pevného bodu F v \mathbb{E}_2 , zvaného ohnisko, a pevné přímky d , zvané řídící přímka, která tímto bodem neprochází, stejně vzdáleností.

Věta_T: V každém bodě \mathcal{P} existuje právě jedna tečna. Tečna půlí vnější úhel průvodičů (tečnu značíme obvykle t , dotykový bod T). Normála n je kolmá na tečnu t v bodě T a půlí vnitřní úhel průvodičů. $\Rightarrow t_V \parallel d$

Věta_P: Množina pat P kolmic spuštěných z ohniska F paraboly \mathcal{P} na její tečny je vrcholová tečna t_V .

Věta_Q: Množina bodů Q , souměrně sdružených s ohniskem F podle tečen paraboly \mathcal{P} , je řídící přímka d .

Věta: Subtangenta je půlena vrcholem V .

Věta: Délka subnormály je rovna velikosti parametru p .

Odevzdávejte poštou a najednou všechny příklady. Budou Vám vráceny opravené poštou přes děkanát. Poznámka při opravách „znovu“ znamená přerýsovat příklad, poznámka „doplňit“ znamená dorýsovat daný příklad.

Test č. 2

Deskriptivní geometrie, I. ročník kombinovaného studia FAST,
letní semestr 2006-2007

Kótované promítání

- (1) (a) Je dána přímka $a(A, B); A[30; 50; 40], B[-20; 20; 10]$. Zobrazte přímku a , stopník P přímky a a její odchylku od půdorysny π .
- (b) Na přímce $p(A, B); A[-40; 50; -10], B[30; 30; 40]$; určete bod M , jehož kota $z = 25$.
- (c) Zobrazte přímku $p(A, B)$ a body C, D, E , které na ní leží, $A[-30; 20; 45], B[15; 45; 10], C[-20; ?; ?], D[?; 30; ?], E[?; ?; -10]$.
- (2) Najděte stopu roviny $\rho(A, B, C)$ a hlavní přímku o kótě 40.
 $A[50; 50; 30], B[0; -10; 50], C[-30; 30; 20]$.
- (3) Je dána přímka $a(E, F)$ a bod A . Určete obraz rovnostranného trojúhelníka $\triangle ABC$ o vrcholu A , jehož strana BC leží na přímce a .
 $E[30; 10; 20], F[-30; 50; 60], A[0; 60; 10]$.
- (4) Určete průmět kružnice k ležící v rovině $\rho(-60; 75; 60)$ a je dána středem $S[15; ?; 40]$ a poloměrem $r = 35$.

Poznámka: Při zadání roviny pomocí jejích tří souřadnic – $\rho(x; y; z)$ – vycházíme z úvahy, že půdorysná stopa p^ρ prochází body $[x; 0; 0], [0; y; 0]$ a třetí bod roviny má souřadnice $[0; 0; z]$. Je možné také uvažovat místo bodu $[0; 0; z]$ hlavní přímku o kótě z , její půdorys prochází počátkem a z vlastnosti hlavních přímek dále plyne, že je rovnoběžný se stopou.

Nepovinné příklady:

- (1) Určete vzdálenost bodu V od roviny $\rho(A, B, C)$.
 $V[0; 20; 70], A[-50; 80; 80], B[-20; 30; 60], C[30; 10; 20]$.
- (2) Zobrazte dráhu bodu $A[0; 34; 45]$, který rotuje kolem přímky $p(M, Q), M[75; 15; 15], Q[5; 85; 55]$.

- (3) Určete průmět čtverce s vrcholem $A[40; 50; 20]$, jehož úhlopříčka BD leží na přímce $e(Q, R)$. $Q[-20; 0; 60]$, $R[20; 90; 20]$.
- (4) Zobrazte rotační válec s osou $o(S, {}^1S)$ o poloměru podstavy $r = 35$. $S[-20; 40; 30]$, ${}^1S[30; 70; 60]$.
- (5) Sestrojte krychli $ABCDA'B'C'D'$ o hraně AB , je-li následující vrchol C v průmětně π . $A[0; 20; 10]$, $B[45; 0; 30]$.

Odevzdávejte poštou a najednou všechny příklady. Budou Vám vráceny opravené poštou přes děkanát. Poznámka při opravách „znovu“ znamená přerýsovat příklad, poznámka „doplnit“ znamená dorýsovat daný příklad.

Test č. 3

Deskriptivní geometrie, I. ročník kombinovaného studia FAST,
letní semestr 2006-2007

Mongeovo promítání na dvě k sobě kolmé průmětny

- (1) (a) Sestrojte stopy roviny α , znáte-li její spádovou přímku první osnovy $s \equiv PN$.
 $P[-40; 55; 0], N[45; 0; 80]$.
 - (b) Určete stopy roviny ρ , zadané dvěma různoběžkami $a \equiv AB, b \equiv AC$.
 $A[-40; 0; 0], B[0; 50; 30], C[0; 20; 50]$.
 - (c) Přímou $a \equiv AB$ proložte rovinu ρ rovnoběžnou s osou x .
 $A[-50; 20; 50], B[50; 50; 30]$.
 - (d) Sestrojte stopy roviny ρ . Rovina je určena bodem A a přímou $m \equiv MN$.
 $A[40; 10; 30], M[10; 60; 50], N[-60; 30; 10]$.
 - (e) Najděte průsečík přímky $p \equiv AB$ s rovinou ρ .
 $A[-70; 80; 80], B[20; 0; 10], \rho(-70; 60; 50)$.
 - (f) Určete průsečík Q přímky $m \equiv KR$, $K[-50; 14; 35], R[0; 27; 8]$, s rovinou dvou rovnoběžek $a \parallel b$, $a \equiv PA$, $P[-50; 39; 0], A[0; 14; 62]$, $b \ni B$, $B[-20; 12; 0]$.
 - (g) Bodem M vedete rovinu α , rovnoběžnou s rovinou ρ .
 $M[50; 30; 50], \rho(-40; 70; 50)$.
 - (h) Je dána rovina ρ , přímka $m \equiv MN$ s rovinou ρ různoběžná a bod R , který neleží ani v rovině ρ , ani na přímce m . Sestrojte přímku p tak, aby procházela bodem R , protínala přímku m a byla s rovinou ρ rovnoběžná.
 $\rho(-44; 16; 28), R[10; 14; 27], M[-40; 19; 34], N[14; 0; 7]$.
- (2) (a) Určete vzdálenost d bodu M od roviny α .
 $M[-30; 40; 50], \alpha(-60; 50; 40)$.
 - (b) Určete vzdálenost d bodu C od přímky $p \equiv AB$.
 $A[-40; 20; 30], B[40; -20; 0], C[0; -50; 40]$.
- (3) Sestrojte (i s vyznačením viditelnosti) zásek dvou trojúhelníků $\triangle ABC$ a $\triangle MNP$.
 $A[-30; 40; 0], B[0; 0; 50], C[40; 60; 40], M[-30; 55; 30], N[-20; 10; 75], P[30; 30; 0]$.
 - (4) Sestrojte řez roviny $\rho(80; 80; 60)$ kosým kruhovým válcem. Kosý kruhový válec má podstavu v půdorysně o středu podstavy $S[-30; 40; 0]$, poloměr kružnice $r = 35$, střed horní podstavy ${}^1S[30; 90; 70]$.

Pokyny: Užijte osové afinity. Najděte $S' = S^1S \cap \rho$ a poté dvojici vzájemně kolmých průměrů v kruhové podstavě. Vyznačte některou affinní dvojici sdružených průměrů. Vyhledejte obrysové body U, V přechodu viditelnosti řezu vzhledem ke 2. průmětu a obrysové body K, R přechodu viditelnosti řezu vzhledem k 1. průmětu.

- (5) Sestrojte krychli, je-li dán její vrchol $A[10; 30; 15]$ a přímka $p \equiv KL$ ($K[40; 45; 10]$, $L[10; 55; 35]$), na níž leží její hrana, která je s bodem A v téže stěně. Zobrazte to řešení, pro nějž A je nejnižším vrcholem krychle vzhledem k půdorysně π .
- (6) Zobrazte průměty rotačního kužele, jehož podstava leží v rovině $\rho(-80; 70; 60)$, její střed je $S[0; 35; ?]$ a dotýká se půdorysny. Výška kužele $v = 60$.

Poznámka: bod, ležící v rovině nesmí být zadáván najednou oběma průměty, chybějící průmět se naopak musí odvodit, aby opravdu takový bod ležel v dané rovině (pomocí hlavních přímek).

- (7) Sestrojte průsečíky přímky $b \equiv RQ$ s kosým kruhovým válcem. Kosý kruhový válec má podstavu v půdorysně o středu podstavy $O[-10; 40; 0]$, střed horní podstavy $L[50; 40; 70]$, poloměr kružnice podstavy $r = 35$; $R[50; 10; 0]$, $Q[-10; 90; 80]$.

Pokyny: Přímkou b proložíte rovinu φ rovnoběžnou s površkami válce. Po volbě libovolného bodu $H \in b$ zavedete $H \in o' \parallel o$ (bodem H rovnoběžku o' s přímkou $o \equiv OL$). Vyhledáte půdorysnou stopu této roviny $\varphi(b, o')$. Rovina φ protne válec ve dvou rovnoběžných površkách e, f . Jejich půdorysné stopníky jsou průsečíky kruhové základny s půdorysnou stopou roviny φ . Průsečíky těchto površek e, f s přímkou b jsou hledané průsečíky X, Y přímky b s válcem. Vyznačte viditelnost přímky b a průsečíků X a Y .

- (8) Určete průsečíky přímky $b \equiv PQ$ s kulovou plochou o středu S a poloměru r .
 $S[-15; 40; 40]$, $r = 37$, $P[-15; 90; 100]$, $Q[15; 10; 0]$.

Pokyny: přímkou b_1 proložte rovinu λ , kolmou k půdorysně (nebo k nárysni). Rovina λ řeze kouli v kružnici m . Vyznačte průměr kružnice m_1 (je to úsečka). Najděte střed M_1 na m_1 . Sklopte přímkou b_1 do (b) a kružnici m_1 do (m) - nejdříve však (M) . Vyhledejte průsečíky (X) a (Y) kružnice (m) a přímky (b) . Promítacími přímkami odvodte X_1 a Y_1 , později X_2 a Y_2 .

Určete viditelnost průsečíků X a Y vzhledem k oběma průmětnám. Vzhledem k 1. průmětu viditelnost rozhodne rovník kulové plochy a poloha bodů X a Y vzhledem k rovníku (posoudíme v druhém průmětu nebo ve sklopeném obraze). Poloha hlavní kružnice na kulové ploše, ležící v rovině rovnoběžné s nárysou rozhodne o viditelnosti průsečíků X a Y vzhledem ke 2. průmětu. Je-li průsečík X nebo Y k pozorovateli blíže než je střed kulové plochy, je viditelný.

- (9) Sestrojte řez kulové plochy, zadané středem S a poloměrem r , rovinou ρ .
 $S[0; 45; 50]$, $r = 40$, $\rho(10; 10; -5)$.

Pokyny: Zavedeme třetí průmětnu μ buď kolmou k π (nebo k ν) středem kulové plochy či poněkud odsunutou. Tedy např. kolmou k π : potom poloha třetí průmětny

(promítá se do přímky μ_1) je kolmá k půdorysné stopě p_1^ρ . Sestrojíme třetí průmět ρ_3 roviny řezu (bude jím přímka) a třetí průmět kulové plochy (tady začneme od středu S_3). Třetí průmět středu M_3 kružnice řezu je patou kolmice k_3 , vedenou kolmo na rovinu řezu ρ_3 . Protože kružnice řezu se promítá (v 3. průmětu) do úsečky, ihned zjistíme průměr této kružnice. Odvodíme do 1. průmětu M_1 . Dále použijeme znalostí o průmětu kružnice v nakloněné rovině ρ (je-li dána středem M a velikostí poloměru). Videlnost vůči 1. průmětu pomůže rozhodnout hlavní přímka ${}^I h^\rho$ první osnovy roviny řezu ρ , vedená středem S . Obdobně videlnost vůči nárysne hlavním přímka ${}^{II} h^\rho$ druhé osnovy.

- (10) Kosý kruhový válec protněte normální rovinou (tj. rovinou kolmou k površkám válce), jdoucí bodem R . Kosý kruhový válec má podstavu v půdorysně o středu podstavy $S[20; 40; 0]$, střed horní podstavy ${}^1 S[-20; 40; 90]$, poloměr kružnice $r = 30$, $R[-50; 0; 0]$. Určete skutečnou velikost řezu.

Odevzdávejte poštou a najednou všechny příklady. Budou Vám vráceny opravené poštou přes děkanát. Poznámka při opravách „znovu“ znamená přerýsovat příklad, poznámka „doplňit“ znamená dorýsovat daný příklad.


Test č. 4

Deskriptivní geometrie, I. ročník kombinovaného studia FAST,
letní semestr 2006-2007


Kolmá axonometrie

Rýsujte tužkou (křivky křivítkem) na volné listy formátu A4 (kancelářský papír). Úkoly č. 1 až 8 můžete vypracovat přímo do zadaných obrázků. U řezů rovinami vyznačte také body přechodu viditelnosti na křivkách řezu. Axonometrický trojúhelník má osu x nalevo.


- (1) Najděte stopy roviny $\alpha(C, b)$ (určené přímkou b a bodem C).




(2) Najděte průsečík $X = b \cap \alpha$ (přímky b s rovinou α).




(3) (a) Najděte chybějící stopu m^α .
 (b) Bodem B veďte rovinu β tak, aby byla rovnoběžná s danou rovinou α .




(4) Najděte průsečnici $g = \alpha \cap \beta$ (a také g_1) rovin α a β .




(5) Kružnice leží v souřadnicové rovině $\nu(x, z)$ a je určena středem S a poloměrem $r = 25$. Kružnici dorýsujte pomocí křivítka.




- (6) Sestrojte průmět kružnice, ležící v půdorysně, je-li určena středem $S = S_1$ a tečnou $b = b_1$.



- (7) S ohledem na viditelnost zobrazte přímý čtyřboký hranol se čtvercovou podstavou v půdorysně, určenou vrcholy A, B . Určete řez rovinou $\sigma(p^\sigma, R)$. Podstavu hranolu volte tak, aby neprotínala půdorysnou stopu roviny řezu p^σ .



(8) Najděte průsečíky X a Y přímky b s kosým čtyřbokým nepravidelným jehlanem.



- (9) V kolmé axonometrii – dimetrii $\triangle(100, 100, 115)$ sestrojte průsečíky přímky $g \equiv PR$ s kosým kruhovým válcem o středu kruhové podstavy ${}^1S[48; 45; 0]$. Podstava má poloměr $r = 40$ a leží v půdorysně, druhá podstava má střed ${}^2S[0; 54; 65]$, $P[48; -10; 0]$, $R[5; 120; 78]$. Dále sestrojte řez tohoto válce rovinou $\alpha(-90; 80; 35)$. Užijte osové afinity, vyznačte střed S elipsy řezu a některé sdružené průměry této křivky řezu.
- (10) V kolmé axonometrii – izometrii $\triangle(100, 100, 100)$ sestrojte řez pravidelného šesti-bokého jehlanu s podstavou v rovině $\mu(y, z)$ o středu $S[0; 60; 60]$, vrcholu podstavy $A[0; 60; 0]$ a výšce jehlanu $v = 174$, rovinou $\alpha(65; -146; 103)$.

Nejdříve některý vrchol řezu jako průsečík boční hrany s rovinou řezu užitím krycí roviny a krycí přímky. Další vrcholy šestiúhelníka řezu už odvozujte užitím kolineace mezi rovinou podstavy a rovinou řezu. Prodlužte strany pravidelného šestiúhelníku k ose kolineace (její stopa roviny řezu v rovině $\mu(y, z)$ podstavy). Využijte důsledně vět o kolineaci a jejích vlastností.

- (11) V kolmé axonometrii $\triangle(90, 100, 80)$ sestrojte řezy koule o středu $S[0; 40; 50]$ a o poloměru $r = 70$ rovinou půdorysný π a rovinou nárysny $\nu(x, z)$. Určete body přechodu viditelnosti na křivkách řezu. Dbejte, aby se křivky řezu vzájemně spolu protínaly na ose x !

Uvědomte si, že poloměr kružnice řezu je závislý na vzdálenosti roviny řezu od středu koule. Proto si mimo obrázek sestrojte kružnici o poloměru, jaký má daná koule a ze známé vzdálenosti roviny řezu od středu koule odvodte příslušný poloměr.


Odevzdávejte poštou a najednou všechny příklady. Budou Vám vráceny opravené poštou přes děkanát. Poznámka při opravách „znovu“ znamená přerýsovat příklad, poznámka „doplňit“ znamená dorýsovat daný příklad.

Test č. 5

Deskriptivní geometrie, I. ročník kombinovaného studia FAST,
letní semestr 2006-2007

Šroubovice a šroubové plochy

- (1) V obr. 1 písemně popište varianty A až D, který z pohybů je *levotočivý* a který *pravotočivý*. Současný posun (příslušný k pootočení) ve směru osy o je vyznačen šipkou.



Obr. 1

- (2) (a) V Mongeově promítání je dána osa $o \perp \pi$, $o_1(0; 35)$. Rozvinutím šroubovice tvořené bodem $A[-15; 12; 25]$ odvodte z dané výšky závitu $v = 40$ odpovídající parametr šroubového pohybu (tj. redukovanou výšku závitu v_o). Na tom, zda je pravotočivá, nezáleží.

- (b) V Mongeově promítání je dána osa $o \perp \pi$, $o_1(0, 30)$. Z dané redukované výšky závitu $v_o = 12$ odvodte výšku závitu v pro bod $B(18, 8, 27)$.

Poznámka: všechny konstrukce na šroubovici se prakticky provádějí pomocí jejího rozvinutí v přímku!

- (3) V Mongeově promítání je dána osa $o \perp \pi$, $o_1(0; 38)$. Bod $C[17; 15; 37]$ přešroubuje levotočivě do nové polohy C' dolů o úhel $\alpha = 120^\circ$ a odvodte také polohu C'_2 , jestliže výška jednoho závitu šroubovice je $v = 50$.
- (4) V Mongeově promítání je dána osa $o \perp \pi$, $o_1(0; 35)$. Vyšroubuje bod $D[-22; 16; 17]$ pravotočivě nahoru o výšku 30mm do polohy D' , jestliže je dána redukovaná výška $v_o = 16$ závitu šroubovice.
- (5) V Mongeově promítání je dána osa $o \perp \pi$, $o_1(0; 35)$. Sestrojte konstruktivně tečnu t levotočivé šroubovice v bodě $E[19; 14; 29]$, je-li dána výška závitu $v = 50$. Konstruktivně, užitím rozvinutí šroubovice do přímky (nestačí tedy jen vyrysováním

celé šroubovice), odvoděte průsečík šroubovice s půdorysnou (tzv. stopník P^s šroubovice).

- (6) V Mongeově promítání je dána osa o , $o_1(0; 37)$, dále tečna $t \equiv PQ$ šroubovice, $P[-31; 25; 0]$, $Q[30; 9; 50]$. Najděte šroubovici, pro kterou je přímka t tečnou. Po- sudte písemně, zda je pravotočivá. Odvoděte dotykový bod T této tečny s hledanou šroubovicí. Dále bod T přešroubuje o úhel $\alpha = 150^\circ$ nahoru, odvoděte velikost současného posunu Δz .
- (7) V Mongeově promítání je dána pravotočivá šroubovice osou $o \perp \pi$, $o_1(0; 36)$, redukovánou výškou závitu $v_o = 13$ a bodem $T[14; 59; 37]$. Sestrojte šroubovici v okolí bodu T , včetně tečny v bodě T .

Nepovinně: Sestrojte v bodě T „Frenetův trojhran“: tečnu t , hlavní normálu n , binormálu b (druhou normálu) a vyznačte také stopy oskulační roviny $\omega(t, n)$.

- (8) V Mongeově promítání je dána pravotočivá šroubovice osou $o \perp \pi$, $o_1(0; 39)$, redukovánou výškou závitu $v_o = 11$ a stopami oskulační roviny $\omega(90; 105; 29)$. Najděte dotykový bod T a sestrojte tečnu t šroubovice, ležící v oskulační rovině ω .

Nepovinně: Najděte dotykový bod T , odvoděte „Frenetův trojhran“ a naneste od bodu T na tečnu t (směrem nahoru), na hlavní normálu n (směrem z válce ven) a na binormálu (směrem nahoru) úsečky, jejichž skutečná délka je 20mm.

- (9) V Mongeově promítání je dán rotační válec o ose $o \perp \pi$, $o_1(0; 35)$, poloměru $r = 19$ se dvěma body na povrchu válce $A[-10; y_A > y_o; 18]$, $B[15; y_B < y_o; 60]$. Spojte tyto dva body po povrchu válce „nejkratší čarou“, tj. šroubovicí. Sestrojte dále v bodě B konstruktivně (nikoli odhadem) tečnu t^B . Vyhledejte konstruktivně (interpolacně, odhadem malých dílků) bod Q přechodu (změny) viditelnosti šroubovice na tomto válcí (na jeho obrysové přímce).

Obrázek můžete přepočítat a zvětšit o 100% na celou plochu A4. Zvolte v půdoryse ten kruhový oblouk, který je kratší. Tím už bude určeno i zda je šroubovice např. levotočivá, vysvětlete v textu. Poté kruhový oblouk rozdělte na 8 dílků a stejně tak na 8 dílků i výškový rozdíl Δz mezi body A a B . Korespondující osminy vyhledejte, vytvoří body hledané šroubovice. Pomocí rozvinutí této šroubovice odvoděte i redukovánou výšku závitu. Nakonec sestrojte tečnu t_B v bodě B .

- (10) V kolmé axonometrii, $\Delta(86, 95, 107)$ vyrýsujte 1.5 závitu pravotočivých šroubovic o poloměru $r = 30$ se společným počátečním bodem $A \in \pi$, osou $o = z$ a redukoványmi výškami v_o , v'_o , v''_o . Tyto redukované výšky volte tak, aby jeden vrchol V řídicího kuželeta měl axonometrický průměr uvnitř, druhý na a třetí vně elipsy (kterou je axonometrický půdorys hledaných šroubovic). Doporučujeme skutečné

velikosti: pro $v_o = 9$, pro v'_o by mělo vyjít asi 15 a pro $v''_o = 22$. Bod $A^o = A_1^o$ volte na oblouku kruhové základny mezi kladnými poloosami x a y tak, aby jeho axonometrický průmět splynul s vedlejším vrcholem elipsy (která je průmětem kruhové základny nosného válce). V pátém dílku na šroubovicích (počítaje od bodu $A = 0, 1, \dots$) sestrojte ke každé šroubovici její tečnu – pomocí vlastností řídícího kuželeta šroubovice.

Pro dělení kruhové základny na 12 dílků užijte afinního vztahu mezi půdorysným průmětem šroubovice a jeho otočeným obrazem.

- (11) V Mongeově projekci je dána *pravotočivá pravoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha* osou šroubového pohybu $o \perp \pi$, $o_1(0, 30)$, parametrem šroubového pohybu $v_o = 18$, šroubuje se úsečka \overline{AB} , $A[-50, 80, 25]$, $B[-15, 45, 25]$. Na ploše je dán bod T' jeho půdorysem $T'_1[25, 42, ?]$. Sestrojte přesně nárys T'_2 a odvodte stopy p^τ , n^τ tečné roviny τ v bodě T' .

[výsledek přibližně: $\tau(-250, 5; 132; 77)$]

- (12) V kolmé axonometrii $\Delta(100, 110, 120)$ sestrojte jeden a čtvrt závitu *pravotočivé pravoúhlé uzavřené šroubové přímkové plochy*, která je určena šroubováním úsečky \overline{AB} . Šroubový pohyb je určen osou $o \equiv z$ a redukovanou výškou závitu $v_o = 15mm$, $A[40, 0, 0]$, $B[0, 0, 0]$. V bodě $T[0, 30, ?]$ sestrojte tečnou rovinu τ , včetně jejich tří stop p^τ , n^τ , m^τ ! Sestrojte křivku, která je čarou zdánlivého obrysu pro axonometrický průmět.


Odevzdávejte poštou a najednou všechny příklady. Budou Vám vráceny opravené poštou přes děkanát. Poznámka při opravách „znovu“ znamená přerýsovat příklad, poznámka „doplnit“ znamená dorýsovat daný příklad.

Test č. 6


Deskriptivní geometrie, I. ročník kombinovaného studia FAST,
letní semestr 2006-2007

Lineární perspektiva


- (1) Nad průměrem $A_S B_S$ (A, B leží v základní rovině π) sestrojte metodou „osmi tečen“ (horní) půlkružnici ve vertikální rovině.




- (2) Sestrojte kvádr $ABCDEFGH$ s podstavou v základní rovině π , je-li dána perspektiva jeho hrany $A_S B_S$ na přímce b_S , přímka b leží v základní rovině π , a je-li dána podmínka, že skutečné velikosti tří kolmých hran jsou v poměru délek: $AB : AD : AE = 2 : 3 : 2$.



- (3) Metodou „sklopeného půdorysu“ sestrojte perspektivu schodiště. Půdorys schodiště je již čerchovaně předrýsován v poloze „sklopeného půdorysu“. Postupujte podle principu, který je na obrázku. Připojte i výšky: boční zídky a jednotlivé stupně schodů. Doplňte nárysem v Mongeově promítání, ve stejném měřítku jako je zadáný sklopený půdorys.






(S) +

(4) Zjistěte skutečné velikosti úseček:


- úsečka AB je horizontální a v průčelné poloze (tj. rovnoběžná s persp. průmětnou),
- úsečka EF je horizontální, ale různoběžná s perspektivní průmětnou.

(5) Zjistěte skutečnou velikost úseček:


- úsečka KL je vertikální a vznáší se nad půdorysnou, jejím perspektivním půdorysem je bod $K_{1S} = L_{1S}$,
- hledá se průmět $J_S V_S$ úsečky JV , je-li její skutečná velikost 3cm . Úsečka je vertikální a je dán její dolní koncový bod J . Přímka, na které leží tato úsečka, má průsečík Q_s s vodorovnou rovinou π , tudíž bod $Q_{1S} = J_{1S}$.





(6) Zjistěte skutečnou vzdálenost mezi bodem A a přímkou l , leží-li tyto útvary v půdorysně π .




- (7) Úběžník horizontální úsečky AB vychází mimo papír. Nastudujte princip „redukování distance“ a zjistěte skutečnou velikost této úsečky užitím tohoto principu.




- (8) Horizontální přímky a, b lze považovat za kolejnice. Sestrojte takovou krychli, která svými hranami „padne“ přesně na tyto kolejnice, tedy délka hrany krychle je rovna rozpětí mezi kolejnicemi (podle náčrtku). Je dána perspektiva jednoho vrcholu B_S této krychle.





- (9) Vertikální obdélník $A_S B_S C_S D_S$ přemístěte o trochu dále (stále nad přímou b_s) do polohy začínající bodem E_S .



- (10) Sestrojte horizontální síť čtvercových kachliček o rozměru hrany kachličky $3cm$, je-li dán výchozí vrchol A_S první kachličky, jejž hrana leží na přímce b . Vykreslete aspoň $16 (= 4 \cdot 4)$ kachliček, umístěných nalevo od přímky b_S . Užijte metody dělicích bodů a kontrolujte i úběžníkem společných úhlopříček těchto kachliček.



- (11) Objekt je dán sdruženými průměty. Vertikální perspektivní průmětna je odkloněna od delší stěny o úhel 30° . Je dán hlavní bod H_1 , velikost distance $d = 140$, výška horizontu $v = 80$. Veškeré kóty u pomocného obrázku jsou v metrech, měřítko je rovno poměru $1 : 100$. Sestrojte perspektivu tohoto objektu (můžete kombinovat metodu sklopeného půdorysu i dělicích bodů). Rýsujte i neviditelné hrany (čárkováně). Perspektivu kružnice sestrojte „metodou osmi tečen“ a připojte ještě další libovolné body kružnice metodou sítě (tvořenou čtverci) a sestrojte v některém z dalších bodů kružnice také tečnu. (Takovou síť nejdříve pokryjte danou půlkružnicí v pomocném obrázku.)



$d=14$
 $v=|HZ|$
 $M=1:100$
 kóty v m

Odevzdávejte poštou a najednou všechny příklady. Budou Vám vráceny opravené poštou přes děkanát. Poznámka při opravách „znovu“ znamená přerýsovat příklad, poznámka „doplnit“ znamená dorýsovat daný příklad.

Mgr. Jan J. Šafařík
 RNDr. Jana Slaběňáková
 Petr Koplík
 Typeset by L^AT_EX