

BAA001 Matematika 1

1. REÁLNÁ FUNKCE JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ

1.7 Polynomy

1.8 Racionální funkce

Mgr. BLANKA MORÁVKOVÁ, Ph.D.

Základní literatura

Dlouhý, Oldřich – Tryhuk, Václav: *Matematika I, Diferenciální počet funkce jedné reálné proměnné*, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2018.
ISBN: 978-80-7204-982-0

1.7 Polynomy

Definice

Reálný polynom *n*-tého stupně je reálná funkce definovaná v \mathbb{R} tvaru

$$f(x) = P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k,$$

kde $n \in \mathbb{N}_0$; $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$.

- a_0, \dots, a_n koeficienty polynomu
- a_0 absolutní člen
- $n = \text{st } f$ stupeň polynomu

1.7 Polynomy

Poznámka:

Polynom stupně

- 0 je konstantní funkce ... např. $P_0(x) = 7$
- 1 je lineární funkce ... např. $P_1(x) = 5x - 1$
- 2 je kvadratická funkce ... např. $P_2(x) = 3x^2 - 4x + 2$

Operace s polynomy

$$f(x) = P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, \quad g(x) = Q_m(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$$

1) Sčítání, odčítání polynomů

$$f(x) \pm g(x) = \sum_{k=0}^n (a_k \pm b_k) x^k \text{ pro } n \geq m$$

Sčítáme / odčítáme koeficienty u odpovídajících si mocnin.

2) Násobení polynomu konstantou

$$r \cdot f(x) = \sum_{k=0}^n r a_k x^k \text{ pro } r \in \mathbb{R}$$

4) Dělení polynomů

Jsou-li P_n, Q_m polynomy stupňů $n \geq m > 0$, pak existují právě dva polynomy H_{n-m}, R_j (stupňů $n - m, j < m$) pro které platí

$$P_n = Q_m \cdot H_{n-m} + R_j, \text{ tj.}$$

$$\frac{P_n}{Q_m} = H_{n-m} + \frac{R_j}{Q_m}, \text{ pokud } Q_m \neq 0$$

Q_m ... dělitel

H_{n-m} ... podílový polynom

R_j ... zbytek

$R_j = 0$... polynom P_n je dělitelný polynomem Q_m

3) Násobení polynomů

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k, \text{ kde } c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$$

Násobíme postupně každý sčítanec prvního polynomu všemi sčítanci druhého polynomu.

Platí

$$\begin{aligned} \text{st}(f + g) &\leq \max(\text{st } f, \text{st } g) \\ \text{st}(f \cdot g) &= \text{st } f + \text{st } g \end{aligned}$$

1.7 Polynomy → Operace s polynomy

5) Rovnost polynomů

$$\begin{aligned} P_n = Q_m &\Leftrightarrow 1. n = m \\ &2. a_i = b_i, \text{ pro } i = 0, 1, \dots, n \end{aligned}$$

Stupeň polynomů a koeficienty u stejných mocnin jsou si rovny.

Příklad 1.4

Jsou dány polynomy $f(x) = 2x^3 - 5x^2 - 3x + 1$, $g(x) = 3x - 2$. Vypočtěte:
a) $f(x) + g(x)$, b) $f(x) \cdot g(x)$.

Příklad 1.5

Jsou dány polynomy $f(x) = 6x^4 + 7x^3 - 6x^2 + 8x - 5$, $g(x) = 2x^2 - x + 1$.
Vypočtěte $\frac{f(x)}{g(x)}$.

Definice

Je-li P_n polynom stupně $n \geq 1$, pak

- číslo $x_0 \in \mathbb{C}$ nazveme **kořenem** polynomu P_n , jestliže platí $P_n(x_0) = 0$;
- číslo $x_0 \in \mathbb{C}$ nazveme **k -násobným kořenem** polynomu P_n , jestliže platí $P_n(x) = (x - x_0)^k \cdot Q_{n-k}(x)$, přičemž $Q_{n-k}(x_0) \neq 0$;
- výraz $x - x_0$ nazýváme **kořenovým činitelem**.

Kořenové vlastnosti polynomů

- Rozklad polynomu v *reálném oboru*:

$$P_n(x) = a_n(x - x_1)^{k_1} \cdots (x - x_r)^{k_r} \cdot ((x - a_1)^2 + b_1^2)^{\ell_1} \cdots ((x - a_s)^2 + b_s^2)^{\ell_s},$$

kde polynom P_n má reálné kořeny x_1, \dots, x_r násobností k_1, \dots, k_r , komplexní kořeny $a_1 \pm b_1 i, \dots, a_s \pm b_s i$ násobností ℓ_1, \dots, ℓ_s a platí $k_1 + \dots + k_r + 2\ell_1 + \dots + 2\ell_s = n$.

Jde tedy o součin polynomů tvaru

- $(ex + d)^k$, $e \neq 0$, $k \in \mathbb{N}$
- $(ax^2 + bx + c)^\ell$, $a \neq 0$, $D = b^2 - 4ac < 0$, $\ell \in \mathbb{N}$

Kořenové vlastnosti polynomů

- V \mathbb{C} má každý polynom n -tého stupně právě n kořenů (přičemž každý kořen je počítán tolíkrát, jaká je jeho násobnost) a platí

$$P_n(x) = a_n(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

Jde o tzv. **rozklad polynomu na součin kořenových činitelů**.

- S každým k -násobným kořenem $a + bi$ má polynom také k -násobný kořen $a - bi$.
- Polynom lichého stupně má alespoň jeden reálný kořen.
- Má-li polynom P_n celočíselné koeficienty $a_i \in \mathbb{Z}$, $i = 0, \dots, n$ a
 - kořen $x_0 \in \mathbb{Z} \Rightarrow x_0 | a_0$,
 - kořen $x_0 = \frac{p}{q}$, kde $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N} \Rightarrow p | a_0$, $q | a_n$.

Příklad 1.6

Najděte reálné kořeny polynomu $f(x)$ a určete jejich násobnost.

$$f(x) = (x - 1)^2(x + 4)(2x - 1)^3(x^2 + x + 1)(5x^2 + 3)^3$$

1.7 Polynomy → Kořenové vlastnosti polynomů

FAST

Hornerovo schéma

$$P_n(x) = (x - c) \cdot H_{n-1}(x) + d, \quad H_{n-1}(x) = b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_1x + b_0$$

$$\begin{array}{c|ccccc|c} & a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & a_0 \\ x=c & b_{n-1} & b_{n-2} & b_{n-3} & \cdots & b_0 & d=P_n(c) \end{array}$$

$$b_{n-1} = a_n$$

$$b_{n-2} = c \cdot b_{n-1} + a_{n-1}$$

$$b_{n-3} = c \cdot b_{n-2} + a_{n-2}$$

:

$$b_0 = c \cdot b_1 + a_1$$

$$d = c \cdot b_0 + a_0$$

je-li $d = 0$ pak c je kořen polynomu $P_n(x)$

1.7 Polynomy → Kořenové vlastnosti polynomů

FAST

Příklad 1.7

Určete kořeny a rozklad v reálném oboru polynomu $f(x)$.

$$f(x) = 2x^5 + x^4 - 5x^3 + x^2 - x + 2$$

1.7 Polynomy → Kořenové vlastnosti polynomů

FAST

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

1.7 Polynomy → Znaménko polynomu

FAST

Věta

Na změnu znaménka polynomu mají vliv pouze reálné kořeny liché násobnosti.

Příklad 1.8

Určete znaménko polynomu

$$f(x) = x^3(x - 2)^5(x - 5)^4(x + 4)(x - 6)^6(x + 1)^2(x - 3)^7(x^2 - x + 1)^2(x^2 + 9)^3.$$

Příklad 1.9

Určete kořeny, rozklad v reálném oboru a znaménko polynomu $f(x)$.

- a) $f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$
- b) $f(x) = x^5 + x^4 - 2x^3 - x^2 - x + 2$
- c) $f(x) = x^3 - 3x - 2$

Příklad 1.10

Rozložte racionální funkci $f(x)$ na součet polynomu a ryzí racionální funkce.

$$f(x) = \frac{2x^3 + x^2 + 1}{x^2 + 2}$$

Definice

Racionální funkci $f(x) = \frac{P_m}{Q_n}$ nazýváme podíl dvou nenulových polynomů P_m, Q_n stupňů m, n .

- $m < n \dots$ **ryzí racionální funkce**
- $m \geq n \dots$ **neryzí racionální funkce**

Věta

Každá neryzí racionální funkce je buď polynom nebo ji lze vyjádřit jako součet polynomu a ryzí racionální funkce.

Věta

Na změnu znaménka racionální funkce $f(x) = \frac{P_m}{Q_n}$, kde polynomy P_m, Q_n nemají společné kořeny, mají vliv pouze reálné kořeny liché násobnosti čitatelce a jmenovatele.

Příklad 1.11

Určete znaménko funkce $f(x)$.

- a) $f(x) = \frac{(x+2)(x-5)^2(2x^2+1)}{x^4(x-1)^3}$
- b) $f(x) = \frac{x^2-1}{x^3+1}$

1.8 Racionální funkce → Rozklad na parciální zlomky T FAST

Věta

Každou ryzí racionální funkci $f(x) = \frac{P_m}{Q_n}$ lze rozložit na součet parciálních zlomků.

- V rozkladu Q_n je $(ex + d)^k$, $e \neq 0 \rightarrow$
→ v rozkladu $f(x)$ je součet k parciálních zlomků:

$$\frac{C_1}{ex + d} + \frac{C_2}{(ex + d)^2} + \cdots + \frac{C_k}{(ex + d)^k}$$

- V rozkladu Q_n je $(ax^2 + bx + c)^\ell$, $a \neq 0, D < 0 \rightarrow$
→ v rozkladu $f(x)$ je součet ℓ parciálních zlomků:

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_\ell x + B_\ell}{(ax^2 + bx + c)^\ell}$$

1.8 Racionální funkce → Rozklad na parciální zlomky T FAST

Příklad 1.13

Rozhodněte, které z racionálních funkcí jsou parciální zlomky.

a) $\frac{4}{(x+2)^3}$

e) $\frac{2}{3x-4}$

i) $\frac{2x-3}{(3x+7)^5}$

b) $\frac{5x-1}{x^2+2x+4}$

f) $\frac{x^2+2x+3}{(4x^2+5)^6}$

j) $\frac{x}{x^2+1}$

c) $\frac{3}{x^2-1}$

g) $\frac{1}{x^2+x+1}$

k) $\frac{2x}{(x^2+7)^3}$

d) $\frac{x}{x+5}$

h) $\frac{1}{x^3+1}$

l) $\frac{x+5}{(x^2+2x-3)^4}$

1.8 Racionální funkce → Rozklad na parciální zlomky T FAST

Příklad 1.12

Napište obecný tvar rozkladu racionální funkce $f(x)$ na parciální zlomky:

$$f(x) = \frac{2x+5}{(x+1)(x-3)^3(x^2+x+1)(x^2+1)^2}$$

1.8 Racionální funkce → Rozklad na parciální zlomky T FAST

Postup při rozkladu racionální funkce na parciální zlomky:

1. Je funkce $f(x) = \frac{P_m}{Q_n}$ ryzí? Pokud není, vydělíme $P_m : Q_n$ a rozkládáme zbytek (RRF).
2. Rozklad jmenovatele Q_n na součin v \mathbb{R} .
3. Obecný tvar (schéma) rozkladu.
4. Výpočet neurčitých koeficientů (konstant).

Příklad 1.14

Rozložte funkci $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + x - 6}$ na parciální zlomky.

Příklad 1.15 !

Určete znaménko funkce $f(x)$ a rozložte ji na parciální zlomky, resp. na součet polynomu s parciálními zlomky.

a) $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - 9x + 18}{x^4 + 3x^2}$

b) $f(x) = \frac{x^4 + x^3 + x^2}{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}$