

FAKULTA STAVEBNÍ
ústav matematiky a deskriptivní geometrie

BAA101 – Matematika 1

5. REÁLNÁ FUNKCE JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ

5.5 Složená funkce

5.6 Inverzní funkce

Mgr. BLANKA MORÁVKOVÁ, Ph.D.

Základní literatura

Dlouhý, Oldřich – Tryhuk, Václav: *Matematika I, Diferenciální počet funkce jedné reálné proměnné*, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2018. ISBN: 978-80-7204-982-0

5.5 Složená funkce


$$\begin{aligned} f &: y = f(u) \\ g &: u = g(x) \end{aligned} \qquad \longrightarrow \qquad f \circ g : y = f(g(x))$$

$f \circ g$ ... **složená funkce**
f ... **vnější složka** složené funkce
g ... **vnitřní složka** složené funkce

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \\ g(x) &= \sin x \end{aligned} \longrightarrow \begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = (\sin x)^2 = \sin^2 x \\ (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = \sin(x^2) = \sin x^2 \end{aligned}$$

... *není totéž!*

$\Rightarrow$ Záleží na pořadí, v jakém funkce skládáme!



Poznámka: $\sin^2 x = \frac{1}{2}\left[1 + \sin(2x - \frac{\pi}{2})\right]$

Příklad 5.2


Určete definiční obor funkce f.

a) $f : y = \sqrt{\sin x}$

b) $f : y = \log_3(4 - x^2)$


Posunutí ve směru osy x:

$$y = f(x \pm a),\ a \in \mathbb{R}^+$$




Posunutí ve směru osy y:


$$y = f(x) \pm a,\ a \in \mathbb{R}^+$$



Stlačení / roztažení ve směru osy x: $y = f(ax),\ a \in \mathbb{R}^+$




Stlačení / roztažení ve směru osy y: $y = af(x),\ a \in \mathbb{R}^+$




Překlopení podle osy x:

$$y = -f(x)$$



Překlopení podle osy y:

$$y = f(-x)$$



5.6 Inverzní funkce


$f : y = 3x - 2, \quad x \in \langle -1, 2 \rangle$ … úsečka mezi body $[-1, -5]$ a $[2, 4]$

$\downarrow$ zaměníme proměnné x a y

$x = 3y - 2$

$\downarrow$ vyjádříme proměnnou y

$f^{-1} : y = \dfrac{x+2}{3}, \quad x \in \langle -5, 4 \rangle$ … úsečka mezi body $[-5, -1]$ a $[4, 2]$



f^{-1} … inverzní funkce k funkci f

Definice

Je-li f **prostá** funkce v $D(f)$, pak k ní existuje **inverzní funkce** $\boldsymbol{f^{-1}}$ definovaná na $H(f)$, přičemž platí

$$[x, y] \in \text{Gr } f \iff [y, x] \in \text{Gr } f^{-1}$$

Platí

- $\boldsymbol{D(f^{-1}) = H(f)}$, $\boldsymbol{H(f^{-1}) = D(f)}$
- $\boldsymbol{f(f^{-1}(x)) = x}$, $x \in D(f^{-1})$ a $\boldsymbol{f^{-1}(f(x)) = x}$, $x \in D(f)$
- $\boldsymbol{(f^{-1})^{-1} = f}$


Platí


- Je-li funkce f rostoucí/klesající, pak je také f^{-1} rostoucí/klesající.
- Grafy funkcí f a f^{-1} jsou symetrické podle osy I. a III. kvadrantu (tj. přímky $y = x$).

Výpočet inverzní funkce f^{-1} z funkce f:

1. V zápisu funkce $y = f(x)$ zaměníme x a y, čímž dostaneme $x = f(y)$.
2. Z rovnice $x = f(y)$ vyjádříme y a máme předpis $y = f^{-1}(x)$.

5.6 Inverzní funkce





$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log_a a^x = x$$

Poznámka: Potřebujeme-li najít inverzní funkci k funkci f, která není prostá na celém $D(f)$, je třeba nejprve funkci f omezit na interval, na němž je prostá.

$$f : y = x^2 - 2,\ D(f) = \mathbb{R}$$

není prostá


$$\downarrow$$

$$g : y = x^2 - 2,\ D(g) = \langle 0, \infty)$$

je prostá

$$\downarrow$$

$$g^{-1} : y = \sqrt{x+2},\ D(g^{-1}) = \langle -2, \infty)$$




Cyklometrické funkce

– funkce inverzní ke goniometrickým funkcím


Arkussinus $y = \arcsin x$

- $D(f) = \langle -1, 1 \rangle, \quad H(f) = \left\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right\rangle$




Arkuskosinus $y = \arccos x$

- $D(f) = \langle -1, 1 \rangle, \quad H(f) = \langle 0, \pi \rangle$




Arkustangens $y = \operatorname{arctg} x$

- $D(f) = \mathbb{R}, \quad H(f) = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$



Arkuskotangens $y = \operatorname{arccotg} x$

- $D(f) = \mathbb{R}, \quad H(f) = (0, \pi)$



x	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\arcsin x$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\arccos x$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	0

x	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
$\operatorname{arctg} x$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\operatorname{arccotg} x$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$

Příklad 5.3

Určete inverzní funkci f^{-1} k funkci f a definiční obor funkcí f a f^{-1}.

a) $f : y = \mathrm{e}^{2x-1}$

b) $f : y = \arcsin(1 - x)$

DĚKUJI
ZA
POZORNOST!